

ĀBELES

Ražošanas ilgums - 17 g.	Mēra vienība	Augļu dārzs uz maza auguma potcelma (4.-20.g.)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Āboli	t	16	350,00	5600,00			
Āboli sulai	t	4	20,00	80,00			
KOPĀ (1)				5600,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Mēslojums:							
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (25:12:30)				
Kalcija nitrāts	kg	9	2,090	18,81			
Amonija nitrāts	kg	29	0,220	6,38			
Kalcija hlorīds	kg	18	0,361	6,50			
Karbamīds	kg	30	0,248	7,44			
Superfosfāts	kg	75	0,246	18,45			
Kālija hlorīds	kg	50	0,289	14,47			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				52,13			
Fungicīdi				178,67			
Insekticīdi				27,13			
Citas mainīgās izmaksas:							
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 17 g.)				592,65			
KOPĀ (2)				908,16			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Vainaga veidošana	h	200	2,50	500,00			
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	10,92	21,84			
Smidzināšana	reizes	10	13,11	131,10			
Zāles applaušana rindst. + zaru smalcināšana	reizes	6	20,00	120,00			
Apdobju smidzināšana	reizes	2	11,00	22,00			
Ražas vākšana	h	107	1,88	201,16			
Transports (60 km)	reizes	3	0,56 Ls/km	100,80			
Šķirošana, fasēšana	h	60	2,00	120,00			
Darbspēks stādījumu atjaunošanai (17 g.)				203,40			
KOPĀ (3)				1420,30			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				2328,46			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				4691,84			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				3271,54			
ATBALSTS							
VPM				55,20			
KOPĀ (7)				55,20			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				3326,74			

Dotais ābeļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ābelēm, kas audzētas augsnē ar 120 kg/ha K₂O un 120 kg/ha P₂O₅ nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0, trūsvielu saturs augsnē 3,0-3,5%.

Audzējot ābeles, augsnes apakškārtai jābūt vidēji smagai-smilšmālam vai mālsmiltij. Minerālmēsli izkaisāmi apdobes joslā. Amonija nitrātu konkrētā situācijā plānots dot tīrvielā 4 g/m². Kalcija nitrātu smidzina uz lapām ar 0,5% šķīdumu līdz jūlija pirmajai dekādei. Smidzināšanu veic vidēji reizi divās nedēļās pēc ziedēšanas. Kalcija hlorīdu smidzina uz lapām ar 1% šķīdumu vasaras otrajā pusē vidēji reizi divās nedēļās. Karbamīdu smidzina rudenī uz birstošām un nobirušām lapām ar 5% šķīdumu.

Vainagu veido pavasarī un vasaras vidū, retirot un izgaismojot. Samaksa par ražas vākšanu rēķināta 0,01 Ls par katru novāktu 1 kg augļu.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ābeļdarzu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivēšanas pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.